

Bipacksedeln: Information till användaren

Ontbort 200 mg tabletter

ibuprofen

Läs bipacksedeln noggrant innan du börjar använda läkemedlet eftersom den innehåller viktig information.

- Använd läkemedlet exakt på det sätt som beskrivs i bipacksedeln eller exakt enligt läkarens ordination eller de råd som apotekspersonalen gett.
- Spara bipacksedeln, du kan behöva läsa den igen.
- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
- Om du får biverkningar, kontakta läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel.
- Kontakta läkare om du inte mår bättre inom ett par dagar eller om du mår sämre.

I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Ontbort är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Ontbort-tabletter
3. Hur du använder Ontbort-tabletter
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Ontbort-tabletter ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Ontbort är och vad det används för

Ibuprofen som finns i Ontbort-tabletterna hör till så kallade antiinflammatoriska läkemedel. Ibuprofen minskar mängden av sådana ämnen i kroppen som orsakar smärta och inflammation varvid det verkar smärtstillande och febernedsättande, minskar rodnad, värmekänsla och svullnad.

Användningsindikationer

Ontbort-tabletter används tillfälligt för behandling av smärta och feber, till exempel vid förkylningssymtom, muskel- och ledvärk, huvudvärk, menstruationssmärter, reumatisk värk eller tandvärk.

Läkaren kan ordinera Ontbort-tabletter också för andra sjukdomar än de som nämnts ovan.

2. Vad du behöver veta innan du använder Ontbort-tabletter

Använd inte Ontbort-tabletter:

- om du är allergisk mot ibuprofen eller något annat antiinflammatoriskt läkemedel eller övriga ämnen i Ontbort-tabletterna (se bipacksedeln, punkt 6)
- om du har eller tidigare har haft magsår eller sår i tolvfingertarmen
- om du lider av svårartad hjärtinsufficiens (orsakar andnöd och svullnad)
- om du lider av astma och är allergisk (överkänslig) för acetylsalicylsyra eller andra inflammationshämmande värkmediciner
- om du är i sista trimestern av graviditeten

Varningar och försiktighetsåtgärder

Du får inte överskrida den rekommenderade längden på behandlingen. Endast för tillfällig och kortvarig användning utan läkares ordination.

Rådgör med din läkare eller apotekspersonal innan du börjar använda Ontbort-tabletter, om:

- din njur- eller leverfunktion är försämrad
- om du har blödande tjocktarmsinflammation (Colitis ulcerosa) eller Crohns sjukdom
- om du har astma

Berätta för läkaren också om du lider av andra sjukdomar eller allergier.

Det finns en risk för njurinsufficiens hos barn och ungdomar som lider av vätskeförlust.

Användning av andra läkemedel och Ontbort

Berätta för läkare eller apotekspersonal om alla andra läkemedel som du använder. Detta gäller såväl receptmediciner som receptfria mediciner, naturläkemedel och naturprodukter. Glöm inte att nämna de läkemedel som du nyligen använt. Effekten av vissa läkemedel kan förändras, eller de kan förändra effekten av Ontbort-tabletterna om man använder dem tillsammans. Läkaren kan då förändra medicineringen eller doseringen.

Exempel på sådana läkemedel är:

- Andra inflammationshämmande värkmediciner bör inte användas samtidigt med Ontbort – det ger inte bättre smärtlindring, däremot riskerar man biverkningar
- blodförtunnande och antikoagulerande läkemedel
- blodtrycksläkemedel (deras effekt kan försvagas)
- kortison-tabletter som tas genom munnen (risken för magsår och sår på tolvfingertarmen ökar)

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar eller misstänker att du är gravid ska du rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Ontbort försvagar i allmänhet inte uppmärksamheten eller prestationsförmågan. För en del patienter kan Ontbort orsaka dåsighet eller andra biverkningar som inverkar nedsättande på prestationsförmågan (se bipacksedeln, punkt 4). Om dessa symptom uppstår ska man undvika att köra bil och andra uppgifter som kräver uppmärksamhet.

3. Hur du använder Ontbort-tabletter

Inta tabletterna tillsammans med en tillräcklig vätskemängd (till exempel ett glas vatten).

Samtidigt intag av en måltid påverkar inte läkemedlets effekt.

Om patienten är ett barn eller en ungdom, kontakta läkare om detta läkemedel behövs längre än tre dygn eller om symtomen blir värre. Långvarigt bruk endast på läkares ordination.

Vuxna och ungdomar över 12 år:

1–2 tabletter högst 1–3 gånger per dygn⁷

Barn:

Högsta engångsdos för barn är 10 mg/kg och högsta dos per dygn är 30 mg/kg.

<u>Ålder</u>	<u>Vikt</u>	<u>Dosering</u>
1–2 år	10–14 kg	½ tablett högst 2 gånger per dygn
2–4 år	14–20 kg	½ tablett högst 3 gånger per dygn
4–8 år	20–25 kg	1 tablett högst 3 gånger per dygn
8–12 år	25–40 kg	1 tablett högst 4 gånger per dygn.

Ontbort 200 mg tabletterna lämpar sig inte för behandling av barn som väger mindre än 10 kg. För dem finns det andra preparat.

Om du har tagit för stor mängd Ontbort-tabletter

Om du har tagit en för stor dos av läkemedlet eller till exempel ett barn har tagit läkemedlet i misstag, ska du alltid kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tfn 0800 147 111) som bedömer riskerna och ger ytterligare anvisningar.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Ontbort orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Biverkningar förekommer oftare hos patienter som är i dåligt skick och som har flera sjukdomar samt hos äldre patienter. Risken för allvarliga biverkningar ökar vid stora doser under långvarig användning och mångfaldigas om man samtidigt tar andra antiinflammatoriska läkemedel.

Vanliga biverkningar (hos fler än 1 av hundra patienter):

- nedstämdhet eller trötthet
- svindel eller huvudvärk
- halsbränna, buksmärtor, illamående och diarré
- nässelfeber, klåda eller kraftig svullnad av hud eller slemhinnor
- ringande öron
- förvärrad hjärtinsufficiens

Mindre vanliga biverkningar (hos färre än 1 av hundra patienter):

- nervositet, mardrömmar
- sår eller blödningar i matsmältningskanalen
- klåda eller stickningar i huden utan synbara orsaker

Sällsynta biverkningar (hos färre än 1 av tusen patienter):

- dimsyn
- fjällande eller blåsbildande eksem i huden
- kraftiga allergisymtom
- nedsatt njurfunktion

Sluta att använda läkemedlet och **kontakta omedelbart** läkare eller närmaste jourpoliklinik om du får följande symtom:

- andningssvårigheter eller andnöd
- kraftig rodnad, klåda och svullnad på huden
- uppsvullnad på tungan eller i svalget
- akut, kraftig magsmärta eller blodiga kräkningar

Kontakta läkare **så snart som möjligt** om du får följande symtom:

- halsbränna och lindriga magbesvär
- svart avföring
- ökad benägenhet för blånader eller blödningar från näsan
- uppsvullna armar och ben
- andra hudsymtom som inte förekommer genast

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, kontakta läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även alla eventuella biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Register över läkemedlens biverkningar

PB 55

00034 Fimea

5. Hur Ontbort-tabletter ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Detta läkemedel kräver inga särskilda förvaringsförhållanden.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen (Utg. dat. eller EXP).

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör sig av med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad innehåller Ontbort-tabletterna

Den aktiva substansen är ibuprofen. En tablett innehåller 200 mg ibuprofen.

Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, förgelatiniserad stärkelse, kroskarmellosnatrium och magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Ontbort 200 mg är en vit, rund och bikonvex filmdragerad tablett vars diameter är 8,2 mm.

Förpackningsstorlekar: 20, 30 eller 50 tabletter i blisterförpackning.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av försäljningstillstånd och tillverkare

Läkemedelsfabrik Ab
Tablettvägen 1
12345 Medicinbyn
Finland

Denna bipacksedel reviderades senast

14.12.2021

*Bipacksedeln är omarbetad från information i bipacksedlarna till preparat som innehåller ibuprofen.
De riktiga bipacksedlarna är mer omfattande och detaljerade.*